

KRZYWA ŻELAZOWA

(= próba doustnego obciążenia żelazem = krzywa wchłaniania żelaza)

1. Pobrać krew na czczo.
2. Pacjent przyjmuje doustnie preparat żelaza odpowiadający 1g siarczanu żelazowego (np. Hemofer). Pacjent przynosi lek ze sobą - powinien wypisać lekarz kierujący.
3. Pobrać krew po 30 min.
 - po 1 godz.
 - po 2 godz.
 - po 3 godz.
 - po 6 godz.
4. Czas mierzy się zawsze od chwili przyjęcia leku!
5. Przez cały czas trwania badania pacjent pozostaje na czczo!

KRZYWA ŻELAZOWA

(= próba doustnego obciążenia żelazem = krzywa wchłaniania żelaza)

1. Pobrać krew na czczo.
2. Pacjent przyjmuje doustnie preparat żelaza odpowiadający 1g siarczanu żelazowego (np. Hemofer). Pacjent przynosi lek ze sobą - powinien wypisać lekarz kierujący.
3. Pobrać krew po 30 min.
 - po 1 godz.
 - po 2 godz.
 - po 3 godz.
 - po 6 godz.
4. Czas mierzy się zawsze od chwili przyjęcia leku!
5. Przez cały czas trwania badania pacjent pozostaje na czczo!

KRZYWA ŻELAZOWA

(= próba doustnego obciążenia żelazem = krzywa wchłaniania żelaza)

1. Pobrać krew na czczo.
2. Pacjent przyjmuje doustnie preparat żelaza odpowiadający 1g siarczanu żelazowego (np. Hemofer). Pacjent przynosi lek ze sobą - powinien wypisać lekarz kierujący.
3. Pobrać krew po 30 min.
 - po 1 godz.
 - po 2 godz.
 - po 3 godz.
 - po 6 godz.
4. Czas mierzy się zawsze od chwili przyjęcia leku!
5. Przez cały czas trwania badania pacjent pozostaje na czczo!