

## Przygotowanie do badania Tomografii Komputerowej

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża lub jej podejrzenie (wyjątek stanowią wskazania życiowe).

U kobiet w wieku rozrodczym badanie TK powinno być wykonane w pierwszej fazie cyklu miesięczkowego (od 1 do 10 dnia).

Na wykonanie badania TK wymagane jest podpisanie zgody pacjenta.

W przypadku badania TK z kontrastem pacjent musi:

- **być na czczo**
- w dniu badania zgłosić się z **aktualnymi wynikami poziomu kreatyniny** i w przypadku chorej tarczycy dodatkowo z wynikiem poziomu TSH
- w przypadku badania TK jamy brzusznej i miednicy pacjent zgłasza się z **niegazowaną wodą (1L – 1,5L), którą pije w czasie wyznaczonym przez personel pracowni**
- badania TK nie należy wykonywać w ciągu 7 dni od badania RTG z barytem (możliwość wystąpienia artefaktów).

W przypadku badania TK bez podawania środka cieniującego pacjent nie musi być na czczo.

Po zakończeniu badania TK z kontrastem zaleca się wypicie ok. 2,5 litra wody niegazowanej, w celu szybszego wydalenia środka kontrastowego.